


# Struv'Less Cat

Doplňkové krmivo



## NUTRIČNÍ CÍL

Zajištění zdravých močových cest při komplikacích se struvitovými kameny formou dodání DL-Methioninu.



## CHARAKTERISTIKA

EasyPill Struv'Less Cat pomáhá okyselovat moč díky přísunu DL methioninu. Přispívá také k dobré kvalitě sliznice močového měchýře díky výtažku PAC z brusinek – zdroji proanthocyanidinů glukosaminu, základní složce glykosaminoglykanů (GAG) a L-tryptofanu.

Koncept Easypill dělá z podávání skutečné potěšení díky své měkké žvýkací struktuře a jedinečné chuti, kterou kočky oceňují.

## ÚČEL POUŽITÍ EP STRUV'LESS

### Kontrola tvorby struvitových kamenů díky DL methioninu:

- Podání 100mg/kg/den zvládne okyselit moč natolik, aby se během 2 až 5 týdnů podpořilo rozpouštění struvitových kamenů a zabránilo se tvorbě nových. 1 peletka Struv'Less Cat obsahuje 400 mg DL-methioninu.

BLANCHARD G et PARAGON BM, « L'alimentation des chiens. Conseils pratiques, rations adaptées », Éditions France Agricole, 2008, 124-128.  
LULICH JP, et al., « ACVIM small animal consensus recommendations on the treatment and prevention of uroliths in dogs and cats », J. Vet. Intern., 2016, 30 : 1564-1574.

### Zajištění zdravých močových cest u koček:

- **Bariérovým účinkem koncentrovaných proanthokyanidinů (PAC)**, které jsou obsaženy v brusinkách. Zabraňují přilnutí bakterií E. coli na sliznici močového měchýře. Doporučené množství pro kočku je 1mg/kg/den PAC. Peletka o hmotnosti 2g Struv'Less Cat obsahuje 10 mg PAC brusinkového extraktu.

HOWELL AB, et al., N. Engl. J. Med., 1998, 339 : 1085-1086.  
MEALEY KL, et al., Ed. Wiley-Blackwell, 2019, 334.

- **Pozitivním vlivem glukosaminu**, prekursoru glykosaminoglykanů (GAG) na integritu sliznice močového měchýře. Peletka o hmotnosti 2g Struv'less Cat obsahuje 40mg glukosamin sulfátu.

RUSSELL AL, et al., Medical Hypotheses, 1999, 52 : 297-301.  
JHA S, et al., The Obstetrician & Gynecologist, 2007, 9 : 34-41.

- **Relaxačními vlastnostmi L-tryptofanu**. Tato esenciální aminokyselina je prekuzorem serotoninu, který se podílí na zvládnání stresu. Stres přispívá k močovým potížím. Denní dávka L-tryptofanu u koček (12,5mg/kg) snižuje úzkost u koček.

JENKINS TA, et al., Nutrients, 2016, 8 : 1-15.  
URSIN R, Sleep Medicine Reviews, 2002, 6 : 57-69.  
PEREIRA GG, et al., Proceedings of BSAVA Congress, Birmingham, 2010.

## KRMNÝ NÁVOD

Perorální podání. Podávejte ½ peletky ráno a 1 peletku večer po dobu až 6 měsíců. Po 5 týdnech může být dávka snížena na ½ peletky ráno a ½ peletky večer.

Vynikající chuť umožňuje spontánní příjem zvířetem. Zajistěte volný přístup k vodě.

Při dlouhodobém používání konzultujte se svým veterinářem.

## SLOŽENÍ

### KRMNÉ SUROVINY

Mikronizovaná drůbeží moučka, monopropylenglykol, glycerin, předželatizovaný rýžový škrob, brusinkový prášek (5%), vepřový koprodukt, glukózový sirup, kachní tuk, glukosamin sulfát 2KCl (2%), chlorid sodný.

### DOPLŇKOVÉ LÁTKY

**Nutriční doplňkové látky:** (v 1 kg): Aminokyseliny: 3c301 – DL-Methionin (200 000mg), 3c440 – L-Tryptofan (20 000mg).

**Technologické doplňkové látky:** konzervační látky a antioxidanty

### ANALYTICKÉ SLOŽKY

Hrubý protein: 30.1% - hrubý tuk: 11.2% - hrubý popel: 6.9% - hrubá vláknina: 1.8% - vlhkost: 22.7%.

## SKLADOVÁNÍ

24 měsíců od data výroby.

Skladujte při pokojové teplotě na suchém místě.

## BALENÍ

Krabička 60g – čistá hmotnost (přibližně 30 peletek po 2g).

